




FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Allegato H

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono

ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE



RAZZA	AREA DIFFUSIONE
Bovini	
Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
Pecora di Corteno	<u>Comunità Montana di Valle Camonica</u> - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Loveno.
Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
Pecora Ciuta	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Campportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna</p>

Caprini	
Capra di Livo o Lariana	<p><u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> – Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana.</p>
Capra Orobica o di Valgerola	<p><u>Comunità Montana Valle Brembana</u> - Comuni di: Algha, Averara, Biello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.</p> <p><u>Comunità Montana della Val Seriana</u> – Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio</p> <p><u>Comunità Montana Valsassina-Valvarone</u> – Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Suggio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Imagna</u> – Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.</p> <p>Comune di Lecco.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</u> - Comuni di: Abbazia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.</p>
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino.</p>

	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Campportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.</p>
<p>Capra Bionda dell'Adamello</p>	<p><u>Comunità Montana Laghi Bergamaschi</u> - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.</p> <p><u>Comunità Montana Val di Scalve</u> - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.</p> <p><u>Comunità Montana Alto Garda Bresciano</u> - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Sabbia</u> - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Trompia</u> - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Camonica</u> - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Biunno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.</p> <p><u>Comunità Montana Sebino Bresciano</u> - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino</u> - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera.</p> <p>Comune di Como.</p> <p><u>Comunità Montana Triangolo Lariano</u> - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.</p>
<p>Capra Verzaschese</p>	<p><u>Comunità Montana del Lario Intelvese</u> - Comuni di: Argegno, Blessagno, Briunno, Carate Uriò, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonna, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pello Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.</p> <p><u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio,</p>

Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana

Comunità Montana Pianbello - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremonaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù.

Comunità Montana Valli del Verbano - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelvecchana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

BOVINI

VARZESE OTTONESE TORTONESE

Organismo di gestione: Registro anagrafico c/o Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950) Via G. Tomassetti 9 – 00161 ROMA – Ufficio Periferico c/o Associazione Provinciale Allevatori di Pavia.

Area diffusione

Provincia di Pavia (tutti i comuni).

Provincia di Milano (tutti i comuni).

Provincia di Lodi (tutti i comuni).

Origini e ubicazione

Originaria dell'area appenninica compresa tra le province di Piacenza, Pavia, Alessandria e Genova, è un bovino di piccola taglia, caratterizzato da mantello fromentino e da doti di rusticità e frugalità notevoli.

La razza, oggi ufficialmente denominata Varzese-Ottoneese, è ormai ridotta notevolmente, pur avendo assistito, ad un recupero non trascurabile soprattutto nella prima metà degli anni ottanta.

A partire dal 1980 il Servizio Ricerca e Sperimentazione della Regione Lombardia avviò un programma d'intervento per la salvaguardia e lo sviluppo della razza, con il supporto scientifico degli istituti universitari delle Facoltà di Agraria e Veterinaria di Milano.

Il programma comprendeva il lavoro di rilevazione delle caratteristiche biometriche e produttive (latte e carne) necessarie alla definizione dello standard di razza e un piano di miglioramento genetico attraverso l'uso dell'inseminazione artificiale.

Per lo **standard di razza** si fa riferimento al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone istituito presso l'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) con Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 19.7.85, modificato da ultimo con Decreto del 20.12.2011 n. 27136.

La consistenza della razza nella parte lombarda del territorio di diffusione si è andata riducendo enormemente nonostante l'impegno dell'amministrazione pubblica, a causa delle dinamiche economiche legate all'esodo rurale. La consistenza al 31.05.2013 nel territorio regionale è di n. 70 fattrici in n. 23 allevamenti (dati Associazione Regionale Allevatori della Lombardia - ARAL).

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 31.12.2013 forniti da A.I.A. (Registro Anagrafico Bovini). La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

NOME	ATTITUDINE	AREA ALLEVAMENTO	DI	FATTRICI
VARZESE OTTONESE	Carne-latte	Pavia, Reggio Emilia, Genova, Alessandria, Piacenza, Milano, Benevento		135 + altre femmine 97

CABANNINA

Organismo di gestione: Registro anagrafico c/o Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950) Via G. Tomassetti 9 – 00161 ROMA. – Ufficio Periferico c/o A.P.A. di Pavia.

Area diffusione

Provincia di Pavia (tutti i comuni).

Origini e ubicazione

Originaria dell'area dell'Appennino Ligure (Val d'Aveto), diffusa nelle province di Genova e La Spezia e successivamente in quelle di Pavia, Parma e Isernia, conta attualmente circa 200 capi allevati in purezza (iscritti al Registro Anagrafico). Il suo nome deriva dalla frazione di Genova denominata Cabanne.

La popolazione viene considerata in pericolo secondo le categorie di rischio della FAO (1992) dopo che il continuo ricorso all'incrocio di sostituzione con la Bruna ne mise in pericolo l'esistenza. Il suo recupero risulta pertanto importante per la valorizzazione delle aree marginali di origine.

A partire dagli anni '70 sono stati effettuati alcuni studi finalizzati ad individuare i caratteri biometrici e produttivi della razza. Nel 1981 l'istituto universitario della Facoltà di Agraria di Milano avviò lo "Studio sulla valorizzazione di due razze bovine autoctone dell'Appennino Settentrionale: Cabannina e Ottonese Varzese". Nel 1982 il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) realizzò il progetto "Difesa delle risorse genetiche delle popolazioni animali". Anche l'Istituto per la Difesa e la Valorizzazione del Germoplasma Animale di Milano (IDVGA) è stato tra gli enti pubblici coinvolti nel programma di conservazione di questa razza.

Descrizione

Razza di taglia piccola e leggera, con groppa ben sviluppata, larga e lunga, leggermente spiovente, corna di medio sviluppo, sottili, dirette lateralmente ed in alto e poi leggermente indietro.

Il colore fondamentale del mantello è il castano scuro, a volte bruno chiaro, con sfumature intermedie; una riga mulina (color crema) caratterizza la linea dorso-lombare, con sfumature rossicce.

Le parti inferiori dell'addome, quelle distali e interne degli arti, presentano una tonalità di colore più chiaro. I peli sono corti e fini, la cute è pigmentata.

Razza rustica, resistente ai vari patogeni, buona pascolatrice adatta a valorizzare le scarse risorse foraggiere di terreni marginali; a duplice attitudine con prevalenza per il latte.

Standard di razza

Per lo **standard di razza** si fa riferimento al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, istituito presso l'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) con Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 19.7.85, modificato da ultimo con Decreto del 20.12.2011 n. 27136.

La consistenza della razza nella parte lombarda del territorio di diffusione è molto limitata.

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 31.12.2013 forniti da A.I.A. (Registro Anagrafico Bovini). La razza non è diffusa in altri Paesi europei

NOME	ATTITUDINE	AREA DI ALLEVAMENTO	FATTRICI
CABANNINA	latte	Genova, Pavia, Alessandria, Piacenza, Varese, Macerata, Aquila, Benevento	201 + altre femmine 82

BIANCA DI VAL PADANA (o Modenese)

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950) Via G. Tomassetti 9 – 00161 ROMA – Ufficio periferico: Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna.

Area di diffusione

Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane.

Origini e ubicazione

La razza ha avuto origine da bovini dal manto fromentino chiaro simili all'odierna razza Reggiana, incrociati a più riprese con tori romagnoli o bovini grigi di tipo Podolico.

La tipologia attuale della razza si è consolidata nella seconda metà del XIX secolo.

La razza prende il nome dal suo areale di distribuzione che interessa le province di Modena estendendosi pure alle province di Reggio Emilia, Mantova, Ferrara e Bologna dove era particolarmente apprezzata per l'ottima produzione di latte.

Nel dopoguerra le consistenze sono andate riducendosi sensibilmente fino ad arrivare alle poche centinaia di capi attuali.

Attualmente la razza è presente in diverse regioni italiane; per quanto riguarda la Lombardia, oltre al mantovano si registrano presenze anche nella provincia di Brescia.

Dal 1985 è stato istituito il Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione. Tale registro è stato istituito per salvaguardare le razze bovine minacciate di estinzione che risultano allevate in Italia e per la salvaguardia di questi patrimoni genetici.

Descrizione

Presenta mantello bianco con gradazioni di grigio alle spalle e alle cosce, corna di medio sviluppo giallognole a punta nera, alle volte il ciuffo frontale può presentare alcune sfumature rossastre in ricordo della sua origine da bovini fromentini. Caratteristica distintiva da altre razze bianche italiane è la accennata morfea detta "spaccatura" ossia una zona a v rovesciata di colore roseo nel centro del musello di colore ardesia.

Tale caratteristica veniva anticamente attribuita al contrasto fra il sangue dei vari ceppi intervenuti nella formazione della razza.

Cute pigmentata. Animali armonici. Taglia e statura medio piccola.

La razza che originariamente era a triplice attitudine (latte lavoro e carne) ha subito negli anni una selezione più spinta verso la produzione di latte. Attualmente è considerata a duplice attitudine (latte e carne).

Standard di razza

Per lo standard di razza si fa riferimento alle norme tecniche del Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone a limitata diffusione, istituito con presso l'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) con Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 19.7.85, modificato da ultimo con Decreto del 20.12.2011 n. 27136.

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 31.12 .2013 forniti da A.I.A. (Registro Anagrafico Bovini). La razza non è diffusa in altri Paesi europei

NOME	ATTITUDINE	AREA DI ALLEVAMENTO	FATTRICI
BIANCA DI VAL PADANA	Latte - carne	Modena, Reggio Emilia, Milano, Brescia, Pavia, Vicenza, Benevento,	461 + altre femmine 299

RENDENA

Organismo di gestione: A.N.A.RE. Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale della Razza Rendena – Trento. (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 854 del 23 ottobre 1984).
Uffici periferici c/o APA di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, Sondrio e Varese.

Area di diffusione

Comuni compresi nelle Comunità montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese

Origini e ubicazione

La zona di origine della razza è la Val Rendena (Trentino) da cui si è diffusa maggiormente nel Veneto (Padova, Vicenza e Verona) e nel bresciano; dopo un periodo di diminuzione delle consistenze, osservata fino agli anni '80, la razza ha avuto una leggera ripresa.

Una zona di più recente diffusione è rappresentata da alcune altre province lombarde nelle zone appenniniche e alpine dove si pratica il pascolo e dove si contano attualmente circa 100 capi in 10 allevamenti.

Descrizione

Colore mantello: uniforme, da castano a castano scuro nelle femmine, da castano a castano molto scuro (quasi nero lucente) nei maschi. Animali armonici. Taglia e statura medio piccola. Pelo liscio; ciuffo e riga lombare con peli rossicci. Mucose nere; musello ardesia con orlature più chiare. Corna leggere, bianche alla base e nere in punta. Ciuffo di peli color avorio all'interno dei padiglioni auricolari. Altezza 130 cm Peso 500 - 550 kg.

La Rendena trova apprezzamento negli allevatori che ricercano razze a duplice attitudine con caratteristiche morfologiche di maggiore rusticità e adattabilità rispetto alle tradizionali razze da latte, in grado di sfruttare al meglio i pascoli con produzioni foraggere più povere e dare comunque una buona produzione in latte e carne (linea vacca vitello), utile a garantire maggiori margini economici all'agricoltura multifunzionale delle zone appenniniche e alpine.

La Rendena è la razza longeva per eccellenza, tale parametro è di grande importanza in quanto consente una bassa quota di rimonta, e quindi una riduzione dei costi di produzione del litro di latte. E' inoltre una razza fertile questo consente la nascita di un vitello all'anno, e la programmazione dei parti nei tempi voluti. Ciò è importante per le aziende che prevedono l'alpeggio nei mesi estivi.

Standard di razza

Per lo standard di razza si fa riferimento alle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico Nazionale della Razza Rendena, approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, con D.M. n. 23346 del 10.08.1995. Il Libro Genealogico è istituito dal 1976.

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 31.12.2013 estratti dal sito A.N.A.RE (Libro Genealogico)

La razza non è diffusa in altri Paesi europei

NOME	ATTITUDINE	AREA DI ALLEVAMENTO	FATTRICI
RENDENA	Latte - carne	Trento, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, La Spezia, Genova, Brescia, Varese, Treviso, Pavia, Bolzano, Mantova, Sondrio Novara, Forlì	4.066

BRUNA LINEA CARNE

Organismo di gestione del Libro genealogico: A.N.A.R.B. Associazione nazionale allevatori bovini razza Bruna - Ufficio centrale del Libro genealogico – 37012 VERONA. (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 598 del 27 Aprile 1960).

Uffici periferici del Libro Genealogico c/o Associazioni Provinciali Allevatori delle aree di allevamento.

Area di diffusione

Comuni compresi nelle Comunità montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Origini e ubicazione

I soggetti presenti in Italia sono di derivazione dalle popolazioni svizzere, austriache e bavaresi della razza Bruna Alpina. Inizialmente a triplice e poi a duplice attitudine, si è infine specializzata nella produzione latte grazie al rinsanguamento con il ceppo americano Brown Swiss determinando l'attuale "Bruna Italiana" diffusa su tutto il territorio nazionale.

I soggetti "Bruna linea carne" conservano caratteristiche più simili a quelli originari a duplice attitudine e si stanno diffondendo nelle zone alpine dove si pratica il pascolo. Nel territorio regionale capi iscritti al Registro del Libro Genealogico sono allevati nelle province di Bergamo e Pavia e altri soggetti, provenienti dal territorio elvetico, risultano essere stati introdotti negli allevamenti dell'area alpina.

Descrizione

Il colore tipico del mantello è marrone da sorcino a castano, uniforme. Musello scuro, color ardesia contornato di bianco. Unghie nere, dure e resistenti. Animali armonici con buone proporzioni tra ampiezze e altezze. Taglia media, testa non pesante con narici e mandibole larghe, corna abbastanza sottili; collo lungo, garrese definito, spalle armonicamente fuse con il collo, petto ampio. Arti in appiombato, ben distanziati con ossatura solida; cosce giustamente muscolose anche se non eccessivamente arrotondate; garretti robusti

La Bruna linea carne trova apprezzamento negli allevatori che ricercano razze a duplice attitudine con caratteristiche di rusticità, fertilità, facilità al parto, longevità e capacità di pascolamento; con caratteristiche morfologiche di rusticità e adattabilità, in grado di sfruttare al meglio i pascoli con produzioni foraggere più povere e dare comunque una buona produzione in latte e carne (linea vacca vitello), utile a garantire maggiori margini economici all'agricoltura multifunzionale delle zone appenniniche e alpine.

Peso all'età adulta compreso tra i 500 e i 600 Kg.

Standard di razza

Il disciplinare del libro genealogico dei bovini di razza bruna, ha in previsione due registri genealogici separati, uno della bruna e l'altro della bruna linea carne. Nelle more dell'istituzione del registro genealogico della Bruna linea carne, l'appartenenza alla razza è attestata da apposita segnalazione sul certificato genealogico di ogni capo.

Sono state definite separatamente le caratteristiche generali e morfologiche della bruna, che presenta spiccate attitudini per la produzione di latte e della bruna linea carne, orientata invece alla produzione di carne, che sono pertanto considerate razze diverse tra loro.

Caratteristiche	Bruna	Bruna Linea carne
	Femmine	
Standard di razza	Mantello marrone dal chiaro allo scuro, uniforme. Sono tollerate macchie bianche ventrali e piccole macchie non molto estese. Musello: generalmente scuro contornato di bianco. Cute della mammella non pigmentata. Peso di 500-700 Kg in età adulta	Mantello marrone da sorcino a castano, uniforme. Musello: scuro, ardesia contornato di bianco. Unghie nere. Conformazione armonica con buone proporzioni tra le ampiezze e le altezze. Peso di 500-600 Kg in età adulta.
Anteriore	Armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte e ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti	Testa non pesante con narici e mandibole larghe, corna abbastanza sottili (è ammessa la decornificazione), collo abbastanza lungo, garrese definito senza vuoto retroscapolare, spalle armonicamente fuse con il collo,

	in appiombato, ben distanziati, con ossa piatte .	petto ampio, arti in appiombato, ben distanziati, con ossatura solida
Linea dorsale	Rettilinea e/o leggermente rilevata, senza vuoto retroscapolare, con lombi larghi e forti senza depressione per essere di sostegno ad un capace addome.	Rettilinea, con lombi larghi e forti
Groppa	Lunga e larga, all'incirca livellata con ischio leggermente più basso dell'ileo, con spina sacrale rilevata ma non alta; attacco di coda non piatto o rientrato o alto; coda piuttosto sottile	livellata e con buone dimensioni, attacco della coda non rilevato, non infossato o rientrato; coda abbastanza sottile
Arti posteriori	In appiombato, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; cosce ben delineate e discese; garretti piatti e larghi, con leggera angolatura, esenti da tare, con tendini e vene evidenti	In appiombato, forti, con ossatura solida; cosce giustamente muscolose anche se non eccessivamente arrotondate; garretti robusti ed esenti da tare
Piedi	Forti, ben serrati e compatti, con tallone alto e con unghia dura e resistente; pastoie forti	Forti, ben piazzati con unghia dura e resistente
Mammella anteriore	Giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, non spaccata, quarti regolari con profilo leggermente arrotondato; vene addominali prominenti e tortuose con fontane ampie; tessuto spugnoso ed elastico	saldamente attaccata, non spaccata, quarti regolari
Mammella posteriore	Saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o leggermente sporgente rispetto a quello delle natiche; quarti regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale ben segnato; tessuto spugnoso ed elastico	
Legamenti	Sospensorio mediano forte, che divide la mammella in due parti uguali e simmetriche	Sospensorio mediano abbastanza forte
Capezzoli	Di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere	Di giuste dimensioni, non troppo lunghi e/o grossi, uniformi, perpendicolari
Piano inferiore mammella	Deve essere parallelo al suolo ed al di sopra della linea dei garretti in relazione al numero dei parti	Parallelo al suolo ed al di sopra della linea dei garretti in relazione al numero dei parti

Maschi		
Caratteri generali	<p>Le caratteristiche morfologiche desiderabili sono analoghe a quelle illustrate per le femmine ad esclusione degli aspetti specifici di quest'ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e una maggior potenza di ogni singola parte.</p> <p>Assenza di gravi difetti riconosciuti trasmissibili alla discendenza</p>	<p>Le caratteristiche morfologiche sono analoghe a quelle illustrate per le femmine ad esclusione degli aspetti specifici di quest'ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e in una maggior solidità e robustezza di ogni singola parte.</p> <p>Assenza di gravi difetti riconosciuti trasmissibili alla discendenza</p>

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 26.05.2010

NOME	ATITUDINE	AREA DI ALLEVAMENTO	FATTRICI
BRUNA LINEA CARNE	Latte-Carne	Bolzano, Trento, Bergamo, Pavia, Verbano-Cusio-Ossola, Viterbo	ITALIA – 193 GERMANIA – 280 AUSTRIA – 1.300 Tot UE: 1.773

GRIGIO ALPINA

Organismo di gestione: A.N.A.GR.A - Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale della Razza Grigio Alpina Via Galvani 38 – 39100 Bolzano. (Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 992 del 23 giugno 1985).

Uffici periferici c/o APA di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, Sondrio e Varese.

Area di diffusione

Comuni compresi nelle Comunità montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Origini e ubicazione

Le zone di origine della razza sono l'Alto Adige e le vallate dolomitiche del Trentino e del bellunese; nuclei di allevamento si trovano anche fuori dalla zona di origine nelle province di Udine, Torino e Campobasso. Una zona di più recente diffusione è rappresentata da alcune altre province lombarde nelle zone appenniniche e alpine dove si pratica il pascolo, dove sono complessivamente allevati 112 capi (dati al 31.12.2013 - L.G. A.N.A.GR.A).

Descrizione

Il colore tipico del mantello è chiaro argento, con sfumature più scure intorno agli occhi, sul collo, sulla spalla e sui fianchi; i tori hanno colori più scuri. Animali armonici. Taglia media, costituzione robusta, apparato locomotorio corretto con unghioni duri. Mucose nere e musello nero con alone bianco. Corna chiare e nere in punta. Altezza 130 cm. Peso 550 - 650 kg.

La grigio Alpina trova apprezzamento negli allevatori che ricercano razze a duplice attitudine con caratteristiche di rusticità, fertilità, facilità al parto, longevità e capacità di pascolamento, in grado di sfruttare al meglio anche i foraggi grossolani.

Interessante la produzione e la qualità di latte e carne (linea vacca vitello) con caratteristiche della carcassa e rese alla macellazione molto buone con eccellente qualità della carne, elementi utili a garantire maggiori margini economici all'agricoltura multifunzionale delle zone appenniniche e alpine.

Standard di razza

Per lo standard di razza si fa riferimento alle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico Nazionale della Razza Grigio Alpina, approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, con D.M. n. 20299 del 02/02/2006. Il Libro Genealogico è istituito dal 1981.

Consistenza:

Si riportano i dati relativi alla consistenza nazionale al 31.12.2013 estratti dal sito A.N.A.GR.A. (Libro Genealogico)

NOME	ATTITUDINE	AREA DI ALLEVAMENTO	FATTRICI
GRIGIO ALPINA	Latte-Carne	Bolzano, Trento, Udine, Belluno, Torino, Como, Sondrio, Brescia, Bergamo, Mantova, Pavia, Campobasso	6.219 (capi 15.627) in 1.621 allevamenti

E' una delle 11 razze che aderiscono alla Federazione Europea delle razze del Sistema Alpino. **La razza non è diffusa in altri Paesi europei.**

OVINI
PECORA DI CORTENO

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa)
Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA - Ufficio periferico c/o A.P.A di Brescia

Area diffusione

Comunita' Montana di Valle Camonica: solo i comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Lovenò.

Origine

Popolazione autoctona, annoverabile fra le razze alpine da carne.
Ubicazione: Il territorio del comune di Corteno Golgi (BS).

Consistenza

Adesioni R.A. anno 2013 sul territorio lombardo (fonte APA –Associazione Provinciale Allevatori di Brescia):
13 allevamenti, 297 fattrici. Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 201 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014).

La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

Descrizione

Taglia: femmine: altezza al garrese cm 60, con un peso di 55-60 kg
maschi: altezza al garrese cm 70, con un peso di 60-65 kg.
Testa: corta, a profilo leggermente montonino non accentuato, orecchie pendenti di medio sviluppo, acorne.
Vello: bianco, poco o semichiuso con bioccoli corti e abbastanza fini.
Tronco: compatto, abbastanza profondo a profilo rettilineo; masse muscolari ben sviluppate soprattutto nella zona dei glutei, ossatura leggera.

Produttività

Carne: la produzione tipica è l'agnellone (generalmente intero) di oltre sei mesi di età macellato a 40-50 kg di peso vivo.
Lana: 2 kg per capo e per anno.
Latte: utilizzato esclusivamente dall'agnello.

Fertilità e fecondità

Animale poliestrile in grado di fornire 3 parti in due anni con una gemellarità del 50%.

Ambiente e allevamento

Allevata in piccoli greggi in modo abbastanza diffuso dagli abitanti del territorio comunale.

Alimentazione

Utilizzazione della buona disponibilità di pascoli della zona con un periodo di stabulazione che dura, indicativamente, dalla fine di novembre alla metà di aprile.

Situazione attuale e obiettivi

L'allevamento ovino ricopre una funzione complementare, ma perfettamente collegata alla cultura e alla tradizione locale. In particolare spicca l'utilizzazione della carne degli agnelloni e delle pecore da riforma, con la quale viene preparato il piatto tipico locale (Cus). La popolazione è stazionaria sia come numero di capi che di allevamenti. L'Associazione Allevatori di Brescia, in qualità di Ufficio provinciale del Registro Anagrafico (istituito con D.M. 21251 del 28/03/1997) sostiene, nell'ambito delle azioni da promuovere negli allevamenti, l'avvio di un corretto programma di scelta degli arieti, con l'obiettivo di poter giungere ad un maggior grado di omogeneità, salvaguardando la popolazione dal rischio di una eccessiva consanguineità.

PECORA BRIANZOLA

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa)
Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA - Ufficio periferico c/o A.P.A di Como e di Lecco

Area diffusione

Provincia di Como (tutti i comuni).
Provincia di Lecco (tutti i comuni).
Provincia di Monza e Brianza (tutti i comuni).

Origine

La popolazione brianzola per la sua morfologia è riconducibile al gruppo delle pecore alpine giganti da carne.

Ubicazione

Era anticamente ubicata nel triangolo compreso tra Como, Lecco e Monza, Attualmente l'area di conservazione della popolazione è ubicata nella fascia pedemontana della Brianza compresa tra i comuni di Cesana Brianza, Civate, Galbiate, Proserpio, Suello e Valmadrera.

Consistenza

Adesioni R.A. anno 2013 sul territorio lombardo (fonte APA Como e Lecco): 34 allevamenti, 994 fattrici. Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 1.189 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014). **La razza non è diffusa in altri Paesi europei.**

Descrizione

Taglia: medio - grande.

altezza al garrese cm 75,4

altezza alla spina sopra sacrale cm 76,5

altezza al torace cm 30,9

lunghezza della groppa cm 23,2

lunghezza del tronco cm 77,3

circonferenza toracica cm 90,9

peso kg. 64,0

Testa: sviluppata in lunghezza ma ben proporzionata, acorne, profilo fronto-nasale montonino più accentuato nei maschi, orecchie pendenti mai portate in avanti o divaricate rispetto all'asse longitudinale del corpo. Collo ben proporzionato.

Tronco: di buona lunghezza nel rispetto della mole, di poco superiore all'altezza al garrese, anteriore dell'animale ben sviluppato con petto possente ma proporzionato, torace profondo, linea dorsale corretta, buon sviluppo anche del posteriore con groppa poco spiovente.

Produttività

Carne: viene allevata principalmente per la carne ottenuta dalla macellazione degli agnelli durante il periodo pasquale e natalizio. La macellazione avviene normalmente ad un peso di circa 15-20 kg. di peso vivo anche se è sempre più richiesto un animale più pesante macellato al peso di 40 kg. di peso vivo.

Lana: pur essendo prodotta in quantità discreta, 2-3 kg anno, non viene utilizzata. Recenti iniziative locali in province limitrofe fanno però intravedere possibili sbocchi anche per questa produzione che attualmente indice solo negativamente sul bilancio aziendale.

Latte: viene normalmente utilizzato direttamente dall'agnello e viene prodotto quasi sempre in quantità sufficiente per portare allo svezzamento anche tre agnelli per parto, essendo molto alta la prolificità di questa razza.

Fertilità e fecondità Animale poliestrato, stagionale concentra i periodi di parto nell'autunno inoltrato o nell'inverno e nel periodo tardo primaverile o estivo. E' possibile raggiungere tre parti in due anni con una gemellarità molto alta (circa 80%). Alta risulta la frequenza dei parti trigemini.

Ambiente e allevamento

Il sistema di allevamento è di tipo familiare stanziale rivolto principalmente all'integrazione di reddito attraverso l'autoconsumo di carne e la vendita a livello locale.

I soggetti vengono normalmente allevati in piccoli greggi e accuditi dai singoli allevatori durante il periodo che va dall'autunno fino alla primavera. Durante questo periodo, ad esclusione dei mesi centrali più freddi, i greggi vengono fatti alimentari nei prati pascoli situati nelle zone limitrofe ai ricoveri. Solo durante il periodo

estivo gli allevatori riuniscono gli animali in greggi più numerosi e gli animali vengono affidati ad un unico pastore. Nel periodo estivo quindi vengono raggiunti pascoli più alti senza mai superare i 1.300 di altitudine.

Alimentazione

Il sistema di allevamento impone quindi un'alimentazione di tipo tradizionale a base di pascolo durante il periodo primaverile, estivo e autunnale e di fieno durante il periodo invernale. La relativa ridotta consistenza dei greggi permette l'auto produzione di fieno e spesso anche dei cereali che vengono somministrati come integratori durante i periodi di maggiore fabbisogno ad esempio in preparazione dei parti e durante la montata latte.

Situazione attuale e obiettivi

E' in atto un piano di consolidamento della popolazione che agisce su più fronti con il principale fine di incrementare numericamente la popolazione ovina Brianzola.

Altri punti di intervento si figurano in:

- conclusione della fase investigativa caratterizzata dall'individuazione dei soggetti e degli allevamenti esistenti;
- proseguimento del rilievo delle misure morfometriche, ad implemento delle esistenti, al fine di argomentare con un maggiore supporto numerico i dati morfologici;
- potenziamento dell'aspetto divulgativo, per ampliare la conoscenza della popolazione anche fuori dall'area d'origine, attraverso pubblicazioni e partecipazione a fiere zootecniche;
- valorizzazione del prodotto carne favorendo una promozione dell'immagine dell'agnello brianzolo.

PECORA CIUTA

Organismo di gestione: Registro Anagrafico in via di costituzione c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA - Ufficio periferico c/o A.P.A di Sondrio

Area diffusione

Comunità Montana Valtellina di Tirano – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Comunità Montana Valtellina di Sondrio – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.

Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.

Comunità Montana Valtellina di Chiavenna – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna

Origine

Popolazione ovina autoctona con probabili origini comuni con la Ciavenasca, originaria della provincia di Sondrio. Ritenuta un tempo estinta, fu ritrovata nei primi anni ottanta in Val Masino (SO) e successivamente nel 2001, in Val Chiavenna, sono stati individuati soggetti allevati in purezza con tratti morfologici riconducibili alla popolazione originaria.

Ubicazione

Val Masino

Consistenza

Nella ricognizione effettuata dal CNR per la redazione dell'Atlante Etnografico delle popolazioni ovine e caprine allevate in Italia (1983) erano stati individuati circa 100 capi.

Nel 2013 l'Associazione Pro Patrimonio Montano (Hape Grunenfelder, Schneebergstr. 17, CH 9000 San Gallo e Dr. Kurt Kusstatscher, via Avigna, 40, I 39050 San Genesio- BZ) con la collaborazione del Dipartimento Veterinario della ASL e dell'APA di Sondrio hanno individuato circa 30 capi riconducibili alla descrizione contenuta nel sopracitato Atlante, con le caratteristiche tipiche della forma delle corna nelle femmine molto simile a quella delle capre. Sono state avviate azioni di informazione per coinvolgere allevatori e gestori del territorio in iniziative di salvaguardia.

Descrizione

Vello e cute: vello bianco-paglierino, semi aperto, formato da blocchi corti.

Testa: tozza a profilo rettilineo; orecchie di media lunghezza, portate orizzontalmente. Corna presenti in entrambi i sessi.

Tronco: tronco corto e tondeggiante, voluminoso nella regione addominale.

Altezza al garrese: maschi cm 45-50, femmine cm 40-45

Peso (Kg): maschi 35-40, femmine 30-35

Taglia piccola.

Produttività

La razza è utilizzata prevalentemente per la produzione di carne che si ottiene da agnelli macellati ad un peso di 12-15 Kg.

Il latte è destinato esclusivamente per l'allattamento degli agnelli.

La produzione di lana per capo è di circa 1 Kg, di qualità scadente.

Fertilità e fecondità

Si ottengono tre parti in due anni, con un tasso di gemellarità molto basso.

Ambiente e allevamento

Viene allevata al pascolo in ambienti difficili, con pascoli poveri e scoscesi.

Alimentazione

Al pascolo con integrazione invernale a base di fieno e foglie secche.

Situazione attuale e obiettivi

La Ciuta non è attualmente presente nel Registro Anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione. La locale associazione allevatori (APA di Sondrio), a seguito delle iniziative di salvaguardia promosse dall'Associazione ProPatrimonio Montano (Hape Grunenfelder, Schneebergstr. 17, CH-9000 San Gallo e Dr. Kurt Kusstatscher, via Avigna, 40, I-39050 San Genesio- BZ) con la collaborazione del Dipartimento Veterinario della ASL e della medesima APA, ha presentato all' Asso.Na.Pa la documentazione con la richiesta di avviare l'iter di inserimento nel sopra citato Registro. Tale azione costituisce la base di supporto per proseguire nel coinvolgimento di altri allevatori e gestori del territorio in iniziative di salvaguardia.

CAPRINI

CAPRA DI LIVO o LARIANA

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa)
Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA – Ufficio Periferico c/o A.P.A. di Como e di Lecco

Area di diffusione:

Provincia di Como - Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio.

Comuni di: Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana.

Origini

Popolazione di origine sconosciuta ascrivibile al gruppo delle razze europee di tipo alpino.

Ubicazione

La popolazione è diffusa nell'area montuosa della catena Mesolcina, in particolare nella valle di Livo e nelle aree del Lario occidentale.

Consistenza

Sono presenti sul territorio lombardo 64 allevamenti con 2.044 fattrici (fonte APA Como e Lecco – anno 2013). Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 2.729 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014).

La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

Descrizione

La capra di Livo o Lariana è una tipica popolazione primaria che non ha subito selezione per caratteristiche esteriori quali tipo di corna, colore del mantello e lunghezza del pelo.

Taglia: capra robusta, di taglia medio – grande.

Testa: proporzionata, con profilo fronto-nasale in genere rettilineo. Le corna possono essere assenti o presenti, con portamento "a stambecco" (scimitarra) o di tipo "markar" (rivolte all'indietro e divaricate). La barba può essere presente o assente. Collo con tette assenti o presenti, bilaterali o unilaterali.

Mantello: molto eterogeneo. Sono presenti soggetti a mantello uniforme di tipo eumelanico (nero, bruno), feomelanico (rosso o giallo) o roano (peli bianchi mescolati a peli pigmentati), soggetti con aree feomelaniche ed eumelaniche con diversa distribuzione ed estensione e soggetti con pezzature bianche, di tipo regolare o irregolare. Il pelo può essere corto, intermedio o lungo.

Tronco: torace e addome ben sviluppati, regione dorso-lombare rettilinea e orizzontale, groppa sviluppata e mediamente spiovente.

Produttività

Carne: la produzione principale è il capretto.

Latte: l'attitudine alla produzione di latte è discreta, prevalentemente finalizzata all'allevamento del capretto.

Fertilità e fecondità

Si ottiene un parto all'anno, con un tasso di gemellarità non elevato.

Ambiente

Le aree di sviluppo individuate per un'eventuale espansione della popolazione caprina, tenendo anche in considerazione i tradizionali e radicati rapporti culturali e commerciali e la vicinanza geografica, sono la provincia di Como, in particolare le valli tra il Lario e il Ceresio e le zone montuose delle sponde occidentali ed orientali del Lario.

Allevamento

Tradizionale estensivo, con un lungo periodo di pascolamento, anche semibrado e in alpeggio, nella stagione favorevole (da maggio a dicembre), e in stabulazione nel periodo invernale.

CAPRA OROBICA O DI VALGEROLA

Organismo di gestione: libro Genealogico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA - Ufficio Periferico c/o A.P.A. di Bergamo, Como e Lecco, Sondrio

Area di diffusione

Comunità Montana Valle Brembana - Comuni di: Algua, Averara, Bello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta, Zogno.

Comunità Montana della Val Seriana – Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatice, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.

Comunità Montana Valsassina-Valvarone – Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

Comunità Montana Valle Imagna – Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuiopiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.

Comune di Lecco.

Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino - Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario.

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine.

Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.

Origini

Razza autoctona originaria dell'omonima valle sita a sud di Morbegno.

Ubicazione

Diffusa nelle Prealpi Orobiche in provincia di Sondrio (Val Gerola e limitrofe), in provincia di Como (Valsassina e alto lago) e di Bergamo (Val Brembana).

Adesioni al Libro Genealogico e Registro Anagrafico:

Numero allevamenti sul territorio lombardo 86; numero femmine 1721 (Fonte APA e ARAL 2013). Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 2.204 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2011).

La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

Descrizione

Taglia: media.

Testa: proporzionata leggera e fine con profilo fronto-nasale leggermente camuso, presenza di barba nei maschi e spesso nelle femmine; orecchie di media lunghezza tendenzialmente erette, mai pendenti; le corna sono molto lunghe in entrambi i sessi, di sezione appiattita con lieve torsione elicoidale, incurvate lateralmente alla base e verso l'alto all'apice; rari i soggetti acorni; il collo è fine e di media lunghezza, con presenza o meno di tette nei due sessi.

Mantello: molto vario, da uniforme - grigio cenere, beige violaceo "farinel", più raramente bianco crema e nero focato a pezzato, con sfumature di tutte le menzionate colorazioni; una variante del mantello pezzato con prevalenza del nero nella metà posteriore e nella testa, contraddistinta da due striature bianche laterali, è conosciuta con il nome di "marin"; il pelo fine e lucente è di notevole lunghezza su tutto il tronco, ma specialmente sulla groppa e sulle cosce; la pelle è sottile e pigmentata in nero.

Tronco: torace ed addome ben sviluppati; regione dorso-lombare rettilinea ed orizzontale, groppa larga e lievemente spiovente, arti corretti, di media robustezza e relativamente corti; apparato mammario sviluppato, ben attaccato, di forma globosa, con capezzoli tendenzialmente piriformi; borsa scrotale ampia.

Produttività

Carne: la produzione è esclusivamente basata sulla macellazione dei capretti, mentre non esiste un mercato delle capre riformate che vengono impiegate per la produzione di insaccati.

Latte: buona, anche in considerazione del basso livello alimentare e del pascolamento in zone spesso marginali.

Produzione media:

Primipare: 200 litri in 150 giorni;

Secondipare: 280 litri in 210 giorni;

Pluripare: 330 litri in 210 giorni.

Fertilità e fecondità

Fecondità annuale: 95%.

Prolificità: 130%.

Età media al 1° parto: 20 mesi.

Ambiente

Tipicamente montano con sfruttamento nel periodo estivo/autunnale di aree spesso marginali di montagna. In alpeggio spesso in associazione con mandrie di bovini.

Allevamento

Stabulazione invernale nel fondovalle con monticazione estiva; viene allevata in aziende di piccole dimensioni (10-15 capi).

Alimentazione

Nel periodo di stabulazione è basata essenzialmente su foraggi secchi in gran parte di produzione aziendale con integrazioni di pane secco, crusca e talvolta di mangimi concentrati o di miscele aziendali soprattutto nel periodo pre e post-parto. L'allattamento dei capretti è in genere naturale.

Situazione attuale e obiettivi

E' una razza che ha saputo resistere in purezza in un'area ben definita. Ha una sua validità economica in quanto il latte viene impiegato nella produzione di formaggi caprini puri o formaggi di tipo misto (di latte vaccino e caprino come il Bitto), ma è importante anche e soprattutto per il mantenimento dell'ambiente rurale montano.

Lo standard di razza è stato approvato dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della specie caprina in data 4.12.92.

CAPRA FRISA VALTELLINESE O FRONTALASCA

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa)
Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA – Ufficio Periferico c/o A.P.A. di Sondrio

Area di diffusione

Comunità Montana Valtellina di Bormio - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Comunità Montana Valtellina di Tirano - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano.

Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.

Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino.

Comunità Montana Valtellina di Chiavenna - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.

Origini

Da tempo è conosciuta come razza Frontalasca, dal nome di Frontale in Val di Rezzalo, località dell'alta Valtellina, da dove viene unanimemente considerata originaria; è da ritenere di ceppo analogo a quello della razza Striata Grigionese.

Ubicazione

Dalla sua culla di origine negli anni si è diffusa in tutta l'alta Valtellina; esistono gruppi consistenti anche sul versante retico (Val Malenco e Val Masino) ed in Valchiavenna.

Consistenza

Numero di allevamenti iscritti a R.A. 2013 sul territorio lombardo: 77 allevamenti, 2.071 fattrici (fonte APA Sondrio. Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 1.911 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014).)

La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

Descrizione

Taglia: grande, lunga e robusta, piuttosto muscolosa ma ben proporzionata; femmine, altezza al garrese circa cm 79.

Testa: leggera e fine nelle femmine, con profilo fronto nasale rettilineo; orecchie portate di lato, obliquamente ed in avanti, con sfumature bianche; le corna sono portate indietro, a scimitarra, esistono però soggetti acorni; il collo è lungo ma robusto, con presenza o meno di tette nei due sessi.

Mantello: è tipicamente nero, ad eccezione di due caratteristiche striature bianche ai lati della testa, del ventre (carattere che può mancare), del sottocoda e delle estremità degli arti, anch'essi di colore bianco; il pelo è di media lunghezza, folto e lucido.

Tronco: lungo, con linea dorso-lombare rettilinea, groppa di buono sviluppo e mediamente spiovente; arti solidi e ben proporzionati; mammella per lo più globosa nelle primipare, tendente al piriforme con l'avanzare dell'età, capezzoli ben sviluppati e forte apparecchio legamentoso di sostegno.

Produttività

Carne: la produzione è da ritenere molto buona in considerazione della notevole mole, della buona indole materna, dell'elevata gemellarità, del peso vivo alla nascita e dei buoni incrementi ponderali dei capretti.

Latte: buona la produzione dei primi mesi dopo il parto, mentre per verificare la produzione dell'intera lattazione sono in corso i controlli funzionali. Non è comunque molto sfruttata per il latte, in quanto è spesso utilizzata per il pascolamento in zone alpine marginali.

Fertilità e fecondità

Buone, la gemellarità è elevata (165%), la mortalità neonatale è molto bassa (2-3%).

Ambiente

Tipicamente montano con sfruttamento nel periodo estivo/autunnale di aree marginali anche di alta montagna.

Allevamento:

Generalmente part-time con lunghi periodi di pascolamento semi-brado nella stagione favorevole e stabulazione invernale.

Alimentazione

Nel periodo di stabulazione è basata essenzialmente su foraggi secchi in gran parte di produzione aziendale con integrazioni di pane secco, crusca e talvolta di mangimi concentrati o di miscele aziendali soprattutto nel periodo pre e post-parto. L'allattamento dei capretti è in genere naturale, l'utilizzo di latte artificiale è poco consueto in quanto la capra produce quantità di latte sufficiente allo svezzamento, anche in caso di parti plurimi.

Situazione attuale e obiettivi

Questa popolazione caprina presenta in altissima percentuale soggetti fenotipicamente omogenei, grazie agli sforzi degli allevatori che ritengono questa capra molto adatta allo sfruttamento di zone marginali, data la sua forza fisica e la sua capacità di adattamento. Anche se questa capra nel passato ha contribuito al sostentamento di generazioni di allevatori, l'importanza attuale della salvaguardia di tale popolazione è rivolta allo sfruttamento di risorse foraggere erbacee, arbustive ed arboree, ma soprattutto al mantenimento dell'ambiente rurale montano, consentendo la permanenza del presidio umano in zone geograficamente disagiate.

L'Associazione Provinciale Allevatori di Sondrio, in qualità di Ufficio provinciale del Registro Anagrafico (istituito con D.M. 21251 del 28/03/1997), realizza i controlli funzionali che forniscono le informazioni atte a conoscere le attitudini produttive della razza ai fini del miglioramento. Pur conservando le doti di rusticità, si intendono infatti esaltare le potenzialità produttive di latte e di carne.

CAPRA BIONDA DELL'ADAMELLO

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA – Uffici Periferici c/o A.P.A. di Brescia Bergamo, Como e Lecco.

Area di diffusione

Comunità Montana Laghi Bergamaschi - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

Comunità Montana Val di Scalve - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

Comunità Montana Alto Garda Bresciano - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Comunità Montana Valle Sabbia - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Comunità Montana Valle Trompia - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmantino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

Comunità Montana Valle Camonica - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Savio dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Comunità Montana Sebino Bresciano - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera.

Comune di Como.

Comunità Montana Triangolo Lariano - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzano, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Tomo, Valbrona, Veleso, Zelbio.

Ubicazione

Il massiccio dell'Adamello (principalmente nella sua parte sud, Val Savio), diffusa pure in tutta la Valle Camonica e presente qua e là in tutta la montagna Bresciana. Sono pure segnalati nuclei nelle zone bergamasche di confine (Val di Scalve e Sebino) e nella zona del triangolo Lariano (Co), dove da decenni è attivo un flusso commerciale con la Val Savio.

Origine

Razza autoctona della Val Camonica, etnicamente ascrivibile al gruppo delle razze europee di tipo alpino. Sulla base dei dati e delle testimonianze raccolte, la razza appare comunque costituita precedentemente a importazioni documentabili, in zone alpine limitrofe, di riproduttori Toggenburg, avvenute nel periodo precedente e seguente la seconda guerra mondiale. L'eventuale influsso della citata razza appare comunque indiretto e di scarsa incidenza come testimoniano le marcate differenze in alcuni tratti morfologici salienti (taglia maggiore, presenza di corna, addome bianco in tutti i soggetti e conformazione più fine della testa).

Consistenza

Numero allevamenti sul territorio lombardo 93; numero fattrici 2.543 (Fonte APA Brescia 2013). Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 2.209 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014).

La razza non è diffusa in altri Paesi europei.

Descrizione

Taglia: medio grande;
femmine altezza cm 72-75 peso kg 55-60
maschi peso kg 70-75

Testa: leggera e fine con presenza di barba nei maschi e nella stragrande maggioranza delle femmine; la presenza delle corna è legata alla scelta degli allevatori e alle tradizioni locali; presenza di tette sul collo.
Mantello: di colore uniforme con tonalità variabili dal marrone chiaro al biondo, la zona ventrale bianca, si estende dal torace alla coda e comprende la parte interna delle cosce; sulla testa sono presenti due striature bianche estese dall'attacco delle orecchie al muso; il pelo è uniformemente lungo.
Tronco: torace ed addome ben sviluppati; regione dorso lombare rettilinea e orizzontale; apparato mammario sviluppato ben attaccato, con capezzoli generalmente piriformi.

Produttività

Carne: la produzione dei capretti, venduti al peso di 12-14 kg, viene ottenuta in 40-50 giorni.

Latte: laddove viene eseguita la mungitura dopo lo svezzamento del capretto si ha una buona persistenza della lattazione (fino a fine settembre).

Fertilità e fecondità

La gemellarità è del 50%.

Allevamento e alimentazione

E' allevata generalmente in greggi di media dimensione, ma non mancano greggi di circa 150 capi; la gestione dell'allevamento è di tipo semi-estensivo con stabulazione invernale, pascolo primaverile-autunnale ed alpeggio estivo.

Situazione attuale e obiettivi

L'allevamento caprino nelle aree montane interessate ha una funzione complementare ad altre attività agricole e non, pur esistendo alcune realtà dove l'allevamento caprino è l'attività economica dominante. I prodotti caseari caprini tipici dell'area di allevamento (mascherpe) godono di un particolare gradimento presso la popolazione, così come alcuni prodotti (berna) ottenuti dalla lavorazione e successiva essiccazione della carne degli animali da riforma.

La popolazione un tempo molto più numerosa, ha subito successivamente un'attività di rimescolamento genetico, legato alla scarsa attenzione che per anni ha caratterizzato l'allevamento caprino in area montana. L'Associazione Allevatori di Brescia, in qualità di Ufficio provinciale del Registro Anagrafico (istituito con D.M. 21251 del 28/03/1997), realizza i controlli funzionali che forniscono le informazioni atte a conoscere le attitudini produttive della razza ai fini del miglioramento. Pur conservando le doti di rusticità, si intendono infatti esaltare le potenzialità produttive di latte e di carne.

Inoltre al fine di salvaguardare e recuperare la razza, persegue nell'ambito dell'attività di consulenza tecnica l'obiettivo di mantenere la variabilità genetica.

CAPRA VERZASCHESE

Organismo di gestione: Registro Anagrafico c/o Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa) Viale Palmiro Togliatti 1587 – 00155 ROMA – Uffici Periferici c/o A.P.A di Como e Lecco, APA di Varese

Area diffusione

Comunità Montana del Lario Intelvese - Comuni di: Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pello Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzona, Val Rezzo, Valsolda, Vercana

Comunità Montana Pianbello - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremona, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù.

Comunità Montana Valli del Verbano - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelvecchio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavigliate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Origini

La razza Verzaschese o nera di Verzasca ha la sua culla di origine nella omonima Val Verzasca, ubicata nelle Prealpi Svizzere a monte di Locarno (Lago Maggiore), dove viene allevata in forma semibrada da tempo imprecisabile. Sotto il profilo etnico è senz'altro da classificarsi tra le razze alpine.

Ubicazione

Dal Canton Ticino, nella seconda metà degli anni '70, riproduttori sia maschi che femmine vennero introdotti nella provincia di Varese e successivamente di Como per sostituire la popolazione caprina locale assai eterogenea. La notevole rusticità e sobrietà della razza ha determinato la sua graduale diffusione, tanto che oggi può considerarsi predominante nell'area montana della provincia di Varese ed in particolare nella Val Veddasca Dumentina (Luino). La razza è presente nel confinante territorio elvetico. Non risulta **diffusa in altri Paesi europei**.

Consistenza

Numero allevamenti sul territorio lombardo 19, numero fattrici 892 (Fonte: APA Como e Lecco, APA di Varese anno 2013). Il numero di fattrici a livello nazionale è pari a 1.201 (dati sito Asso.Na.Pa - anno 2014).

Descrizione

Taglia: medio grande;

femmine: altezza al garrese circa cm 76.

Testa: corna sempre presenti in ambo i sessi, lunghe, larghe ed appiattite, dirette verso l'alto ed incurvate all'indietro nelle femmine.

Mantello: nero uniforme, con pelo di media lunghezza.

Produttività

Latte: produzione buona, come pure i titoli di grasso e proteine. Si producono formaggi caprini e misti con latte vaccino, freschi e stagionati.

Carne: Buona attitudine alla produzione carnea per l'elevato peso alla nascita capretti, venduti al peso di Kg 15 circa. Si producono inoltre insaccati stagionati con gli animali da riforma.

Fertilità e fecondità

La gemellarità è del 21%.

Allevamento e alimentazione

E' allevata generalmente in greggi di dimensione medio-grande; la gestione dell'allevamento è di tipo semi-estensivo con stabulazione invernale, pascolo primaverile-autunnale ed estivo.

Stato attuale e obiettivi.

Le caratteristiche morfologiche di questa razza sono particolarmente adatte per l'allevamento semibrado, specialmente in area montana e per lo sfruttamento di pascoli marginali anche dirupati.

La costituzione di tipo più "respiratorio", rispetto alle altre razze alpine, conferisce una buona predisposizione alla produzione del latte e la scelta degli allevatori della zona dove si è diffusa lo conferma.

L'Associazione Allevatori di Varese, in qualità di Ufficio provinciale del Registro Anagrafico (istituito con D.M. 21251 del 28/03/1997), realizza i controlli funzionali che forniscono le informazioni atte a conoscere le attitudini produttive della razza ai fini del miglioramento. Pur conservando le doti di rusticità, si intendono infatti esaltare le potenzialità produttive di latte e di carne.